

# โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



คือ กลุ่มโรคที่ติดต่อกันจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ แบ่งตามลักษณะอาการ ดังนี้

## แผล ได้แก่

ซิฟิลิส แผลริมอ่อน  
เริ่มอวัยวะเพศ



## ฝี ได้แก่

กามโรค  
ของต่อมและท่อน้ำเหลือง  
หรือฝีมะม่วง

## หนอง

ได้แก่ หนองใน  
หนองในเทียม



## อื่นๆ ได้แก่

หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก  
พยาธิช่องคลอด  
เชื้อราช่องคลอด โលน หิด

## ซิฟิลิส (Syphilis)



**สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ **Treponema pallidum**  
**ระยะฟักตัว** ประมาณ 10 - 90 วัน

### อาการ

**ระยะแรก** มีแผลที่อวัยวะเพศ หรือที่อื่นๆ แผลไม่เจ็บและหายเองได้ แม้ไม่ได้รับการรักษา

**ระยะที่ 2** มีผื่นขึ้นตามลำตัว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บไม่คัน ผอมร่วง ฯลฯ ระยะนี้ถ้าตรวจเลือด จะพบ **"เลือดบวกซิฟิลิส"**

**ระยะที่ 3** หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา โรคจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ หลอดเลือด สมอง กระดูก ทำให้พิการ และตายได้

**ซิฟิลิสกรรมพันธุ์** มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์อาจแท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือให้กำเนิดทารกที่เป็นโรคซิฟิลิส เด็กที่รอดชีวิตอาจจะมีดังงูมกยุบ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาบอด



ซิฟิลิสอันตราย  
อาจถึงตาย ถ้าไม่รักษา

## แผลริมอ่อน (Chancroid)



**สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ **Heamophilus ducreyi**  
**ระยะฟักตัว** ประมาณ 3 - 7 วัน

### อาการ

**ผู้ชาย** จะมีตุ่มหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตกเป็นแผล มักมีหลายแผล ขอบไม่แข็งและไม่เรียบ มีเลือดออกเจ็บปวดมาก บางคนต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อฝีแตกจะเป็นแผลใหญ่

**ผู้หญิง** ส่วนใหญ่จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ถ้ามีแผลที่ผนังช่องคลอด หรือปากมดลูกก็อาจไม่มีอาการหรือมีตกขาว ปัสสาวะขัด หรือเจ็บเวลาร่วมเพศ

แผลริมอ่อน ทั่วเจ็บทั่วปวด  
ถ้าไปตรวจ ถ้าจะหาย



## หนองใน (Gonorrhoea)



**สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Neisseria gonorrhoea  
**ระยะฟักตัว** ประมาณ 3 - 5 วัน

### อาการ

**ผู้ชาย** จะมีอาการปัสสาวะขัด แสบ มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หากไม่ได้รับการรักษาเชื้อจะลงไปสู่ถุงอัณฑะทำให้เกิดอาการอักเสบอีกเสบ อาจทำให้เป็นหมันได้

**ผู้หญิง** ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หากมีอาการจะมีตกขาวมากผิดปกติ บางครั้งมีหนองปนออกมา ปัสสาวะแสบขัดปวดท้องน้อย บางรายอาจมีฝีเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ กลายเป็นหมัน

**หนองในที่ตา** เกิดได้ในกรณีที่สัมผัสกับ เชื้อโดยตรง เช่น มือสัมผัสกับหนองแล้วเช็ดตา หรือทารกที่คลอดผ่านช่องคลอดของมารดาที่มีเชื้อหนองใน ถ้าไม่รักษาอาจทำให้ตาบอดได้

หนองใน ภัยทางเพศ เป็นต้นเหตุ อีลเอดส์ร้าย



## หนองในเทียม (Non - Specific Urethritis)

**สาเหตุ** เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Chlamydia trachomatis  
**ระยะฟักตัว** ประมาณ 1 - 4 สัปดาห์

### อาการ

**ผู้ชาย** จะมีอาการแสบหรือคันที่ท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัด อาจมีมูกใสหรือมูกขุ่น มักพบตอนตื่นนอน

**ผู้หญิง** ส่วนมากมักไม่มีอาการ ส่วนน้อยอาจมีตกขาว

หนองในเทียม ไม่รุนแรง แต่จะหาย ด่ารักษา

## คำแนะนำ ขณะป่วยและรักษา



- ❑ ในผู้ชายไม่ควรรัดอวัยวะเพศเพื่อดูหนอง เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น
- ❑ ไม่ควรซื้อยารักษาตนเอง ควรตรวจรักษา กับแพทย์เท่านั้น เพราะอาจทำให้เชื้อดื้อยา รักษาไม่หาย
- ❑ ควรงดร่วมเพศ รวมทั้งสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
- ❑ ควรงดดื่มเหล้า-เบียร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ❑ ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- ❑ ควรพาคู่่นอนไปตรวจโดยเร็วที่สุด
- ❑ เมื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย
- ❑ ผู้ป่วยชายควรกลั้นปัสสาวะก่อนมาตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- ❑ รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

## โรคติดต่อ

# ทางเพศสัมพันธ์

SEX  
SOUBKOB  
ตอบ OK

เรื่องต่างๆ ก็มี รักษาของเรา

แสดงความห่วงใย  
ด้วยการสวม  
ถุงยางอนามัย  
ทุกครั้ง



สคร.11 นครศรีธรรมราช

<http://odpc11.ddc.moph.go.th>

www.facebook.com/dpc11.ddc Tel: 075 341 147 Fax: 075 342 328



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422